Gynauxil

Вагінальні супозиторії

Інструкція для застосування

1. Опис продукту
2. Склад
3. Опис властивостей
4. Показання
5. Спосіб використання
6. Протипоказання та застереження
7. Зберігання
8. Виробник

1. Опис продукту

Вагінальні супозиторії Gynauxil — це медичний засіб у формі затверділої олійно-водної емульсії, що містить інгредієнти, які сприяють адгезії до слизової оболонки піхви. Мукоадгезивні властивості супозиторіїв Gynauxil сприяють появі бар'єру на слизовій оболонці піхви, що сприяє підтримці належного стану статевих шляхів та інтимних зон: правильного зволоження та живлення епітелію, а також стимулює розвиток природної бактеріальної флори. Супозиторії містяться в окремих блістерних прорізах, розділених перфорацією.

2. Склад

Gynauxil містить гіалуронову кислоту у формі частково зволоженого гіалуронану та поживні речовини, які стимулюють ріст бактерій Lactobocillus, які є основним компонентом нормального вагінального біоценозу.
Склад: глюкоза, дріжджовий екстракт, гіалуронат натрію, молочна кислота, ацетат натрію, хлорид натрію, хлорид калію, сульфат магнію, сульфат марганцю, жирна основа: тригліцериди жирних кислот, вода, поліоксиетиленсорбітан моноолеат, етоксильований цетостеариловий спирт, моногліцерид рицинолевої кислоти.

3. Опис властивостей

Після введення у піхву та розчинення при температурі тіла супозиторія Gynauxil перетворюється на мукоадгезивну емульсію, яка контактує зі слизовою оболонкою. Гіалуронова кислота має властивості, які відновлюють епітелій, підтримують вологу, стимулюють процеси відновлення і оновлення тканин. Екстракт дріжджів є джерелом вітамінів групи В, а також амінокислот і нуклеотидів, разом з електролітом водної фази емульсії сприяє селективному розмноженню бактерій Lactobacillus.

4. Показання

Відновлення або підтримання належного pH, що створює умови для пригнічення бактеріальних та грибкових інфекцій. Полегшення симптомів, пов'язаних із сухістю піхви, у тому числі викликаних дефіцитом естрогену.
Зміцнення природної бактеріальної флори піхви, наприклад, після антибіотикотерапії, пологів, менструації в період ендокринних

розладів, у разі зниження кількості молочнокислих бактерій у вагінальному біологічному тесті. Протидія станам атрофії слизової оболонки піхви.

5. Спосіб використання

Супозиторію необхідно глибоко помістити в піхву.

Жінки з менструацією / жінки репродуктивного віку: вводити по 1 супозиторії щодня протягом п'яти днів поспіль, починаючи з 1-го дня після закінчення менструації. Продовжуйте діяти за цією схемою протягом 2-3 послідовних менструальних циклів або до тих пір, поки не відчуєте себе краще. Ваш лікар може призначити інший метод застосування, до якого слід адаптуватися.
Жінки в період менопаузи та постменопаузи: вводити по 1 супозиторії день за днем протягом 10 днів поспіль або відповідно до рекомендацій лікаря. Зробити перерву приблизно на 2 тижні, після чого можна відновити використання. При появі менструації застосування слід припинити і відновити після закінчення менструації.

Застосовувати супозиторії найкраще на ніч.

Для того, щоб витягти супозиторії, слід розірвати упаковання вздовж перфорації, потім розкрити комірку. Застосуйте супозиторію відразу після того, як дістали її з комірки.
Супозиторії можуть мати бежевий колір. Це пов'язано з наявністю екстракту дріжджів і глюкози в препараті, проте не впливає на якість продукту.

CE 0197 NON STERILE 25°C

6. Протипоказання та застереження

Не вживати при підвищеній чутливості до будь-якого з компонентів препарату. Якщо у вас є сумніви, проконсультуйтеся про використання препарату з гінекологом. Не використовувати під час менструації. Після введення свічки не вступайте в статевий акт. Не застосовуйте супозиторії Gynauxil для лікування генітальних інфекцій та запалень. Будьте особливо обережні, якщо ви схильні до алергії. Якщо після використання препарату з'явилися екзема, набряк, свербіж або інші неприємні симптоми в області вульви, припиніть використання та зверніться до лікаря. Не використовуйте продукт разом з іншими препаратами, які вводяться вагінально. Сумісність продукту з матеріалами бар'єрної контрацепції, такими як кільця, діафрагми або внутрішньоматкові спіралі (латекс, поліуретан), не були перевірені, тому супозиторії Gynauxil не рекомендується використовувати одночасно з цими засобами. Вагітним жінкам і матерям, які годують груддю, використовувати продукт можна тільки після консультації з гінекологом.

Не використовуйте, якщо первинна упаковка пошкоджена.
Зберігати в недоступному для дітей місці.

7. Зберігання

Зберігати продукт при температурі не вище 25°C. Не перевищуйте рекомендовану температуру зберігання. Для забезпечення потрібної температури препарат можна помістити в холодильник (2-8°C).

8. Виробник

"Polski Lek – Dystrybucja" Sp.z o.o.
Ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, Polska

Дата оновлення інструкції: 24.02.2020

02.2020/v1