Tabletki Emskie z Wadowic

Таблетки з апельсиновим смаком

Інструкція для медичного застосування

1. Опис препарату
2. Склад
3. Фармакологічні властивості
4. Показання
5. Спосіб застосування та дози
6. Протипоказання та особливості застосування
7. Умови зберігання
8. Упаковка
9. Виробник

1. Опис препарату

Таблетки Emskie z Wadowic (Емське з Вадовіц) містять замінник емської солі з такою ж кількістю основних катіонів, аніонів та еквівалентним показником pH.

2. Склад

Натрію бікарбонат, натрію хлорид, калію гідрокарбонат, магнію сульфат, дикалію фосфат, допоміжні речовини: сорбіт, натуральний ароматизатор, ксиліт, мальтодекстрин, полівінілпіролідон, бета-каротин, сахаринат натрію, апельсиновий порошок (0,1%).

3. Фармакологічні властивості

Таблетки Емське з Вадовіце для розсмоктування забезпечують тривалий контакт слаболужної солі зі слизовою оболонкою ротової порожнини та горла. Емська сіль залужнює та розріджує виділення. Місцева підвищена концентрація катіонів і аніонів викликає транспортування води за принципом осмосу. Ці механізми стимулюють секрецію слизу та полегшують відхаркування, що заспокоює кашель і захриплість. Таблетки Емське з Вадовіце відновлюють баланс pH в ротовій порожнині.

4. Показання

Полегшення відхаркування, полегшення симптомів, пов'язаних із відчуттям сухості в роті або горлі та симптомів пов'язаних з болем, що супроводжує ці недуги. Підвищує pH у ротовій порожнині. Препарат також можуть використовувати особи, в яких під час роботи задіяні голосові зв'язки, а також особи, які працюють у запилених або сухих, опалювальних приміщеннях.

5. Спосіб застосування та дози

Дорослим та дітям від 6 років: повільно розсмоктувати по 1 таблетці 3–5 разів на добу. Максимальний термін застосування — 3 тижні.

6. Протипоказання та особливості застосування

Приймаючи препарат, потрібно звертати увагу на кількість споживаної кухонної солі та обмежити її споживання. З обережністю застосовувати людям, які дотримуються дієти з низьким вмістом натрію.
Вміст натрію в 1 таблетці: 45 мг.
Не застосовувати з іншими препаратами для розсмоктування.
Препарат може спричиняти шлунково-кишковий дискомфорт у вигляді подразнення слизової оболонки шлунка, печії, метеоризму.
Не застосовувати хворим на туберкульоз, коклюш, плеврит.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Не використовувати після закінчення терміну придатності. Термін придатності вказаний на картонній коробці та блістері.
Не використовувати, якщо первинна упаковка пошкоджена.
Використовувати відповідно до інструкції для медичного застосування.

7. Умови зберігання

Зберігати при температурі 5–25°C у сухому недоступному для дітей місці.

8. Упаковка

Упаковка містить 12 таблеток.

9. Виробник

"Polski Lek" S.A., ul. Chopina 10,
34-100 Wadowice, Polska

Дата оновлення інструкції: 10.07.2020

5°C 25°C

00DR156TSEMPOMPL01/v1