

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

1. ОПИС ПРЕПАРАТУ
2. СПИСОК ІНГРЕДІЄНТІВ
3. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
4. ПОКАЗАННЯ
5. СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
6. ПРОТИПОКАЗАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
7. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
8. УПАКОВКА
9. ВИРОБНИК

1. ОПИС ПРЕПАРАТУ

Пастилки для горла з апельсиново-грейпфрутовим смаком.

Медичний препарат. Продукт можна використовувати:

- при запаленні слизової оболонки ротової порожнини та горла;
- при інфекціях верхніх дихальних шляхів, грипі, застуді, що супроводжуються болем у горлі, сухістю у роті або захриплістю голосу.

Препарат можуть використовувати особи, в яких під час роботи задіяні голосові зв'язки, а також особи, які тривалий час перебувають в сухих приміщеннях або інших несприятливих кліматичних умовах (пил, задимлення, опалення приміщення).

2. СПИСОК ІНГРЕДІЄНТІВ

СКЛАД: екстракт кореня алтеї лікарської (*Althaea officinalis* L.) DER 3-4: 1, екстракт прополісу; ментол, евкаліптова олія, олія м'яти перцевої.

ІНШІ ІНГРЕДІЄНТИ: Підсолоджувач: ізомальт, ароматизатор червоного грейпфрута, олія бразильського апельсина, підсолоджувачі: стевіол глікозиди, сукралоза.

Вміст активних речовин	1 пастилка
Екстракт прополісу	33 мг
Екстракт кореня алтея (<i>Althaea officinalis</i> L.) DER 3-4: 1	35 мг
Олія м'яти перцевої (<i>Mentha arvensis</i> L.)	2,5 мг
Евкаліптова олія (<i>Eucalyptus Globulus Labill.</i>)	3 мг
Ментол	3,5 мг

3. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Пастилки для горла містять інгредієнти, які покривають слизову оболонку ротової порожнини, створюючи на їх поверхні бар'єр із зволожуючими та антисептичними властивостями. Ефірні масла та ментол полегшують дихання.

4. ПОКАЗАННЯ

- Зняття запалення горла, болю в горлі та захриплості,
- Полегшення симптомів, пов'язаних із сухим кашлем, сухістю у роті або горлі,
- Полегшення дихання — застосування олійних інгаляцій.

5. СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Діти старше 6 років і дорослі.

Розсмоктувати повільно 1 пастилку за потреби, 3-5 разів на день.

6. ПРОТИПОКАЗАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Не вживати при підвищеній чутливості до будь-якого з компонентів препарату. Не вживати після закінчення терміну придатності. Використовуйте відповідно до інструкції для застосування. Не використовуйте, якщо первинна упаковка пошкоджена. Якщо стан здоров'я не покращується або симптоми погіршуються через тиждень, зверніться до лікаря. Дані щодо застосування цього медичного препарату вагітним жінкам та жінкам в період грудного вигодовування, відсутні. Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем. Не застосовувати дітям віком до 6 років через ризик захлинання.

7. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому недоступному для дітей місці при кімнатній температурі до 25°C.

Захищати від світла.

8. УПАКОВКА

Блістер, що містить 24 пастилки.

9. ВИРОБНИК



"POLSKI LEK" Sp. z o.o.
ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice
Polska

