

Actiferol Fe krople

Suplement diety.

Zawiesina doustna.

Produkt przeznaczony dla niemowląt, dzieci i dorosłych.

Żelazo jest mikroelementem potrzebnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci. Przyczynia się do prawidłowego tworzenia hemoglobiny i czerwonych krwinek, co ma duże znaczenie dla rosnącego organizmu dziecka. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Jest składnikiem hemoglobiny, która warunkuje transport tlenu.

Actiferol Fe® zawiera unikalną formę żelaza poddaną mikronizacji i emulgacji. Dzięki mikronizacji, czyli dużemu rozdrobnieniu, przyswajalność żelaza z pirofosforanu żelaza(III) jest dwukrotnie wyższa co potwierdzają badania naukowe[1]. Żelazo zawarte w Actiferol Fe® uwalnia się w jelitach, a nie w żołądku. Dzięki temu nie odczuwa się dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.



Skład:

Składniki: rafinowany olej MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy) z ziarna palmy; skrobia; difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza (III)); przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli; emulgator: lecytyny.

Zawartość składników mineralnych w zalecanej dziennej porcji.

Porcja	Zawartość żelaza	RWS	
5 kropli	2,5 mg	18%	dla niemowląt i dzieci poniżej 4 roku życia
10 kropli	5 mg	36%	dla dzieci powyżej 4 roku życia
20 kropli	10 mg	71%	dla dorosłych
30 kropli	15 mg	107%	
40 kropli	20 mg	143%	

RWS - % dziennych Referencyjnych Wartości Spożycia (dla osób dorosłych)

Sposób użycia:

Przed użyciem należy energicznie wstrząsnąć butelką w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny. Odpowiednią ilość kropli odmierzyć na łyżeczkę i podać bezpośrednio doustnie. Po pierwszym otwarciu zużyć w ciągu 2 miesięcy.

Zaleca się spożywać 5-40 kropli dziennie.

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.

Opakowanie:

- 30 ml

Piśmiennictwo:

1. Jackowska T., Sapała-Smoczyńska A., Kamińska E., Dev Period Med. 2015 Apr-Jun 19(2):217-24.